

วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เนื่องจากในปัจจุบันเราใช้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชนิดที่ทำจากเซลล์เพาะเลี้ยง (ฉีด 5 ครั้งเท่านั้น) เพราะมีประสิทธิภาพสูง ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่อระบบประสาท และควรฉีดเชรุมรวมด้วย ถ้าบาดแผลมีเลือดออก ถูก เลี้ยวที่ริมฝีปาก น้ำลายกระเด็นเข้าตา

สถานภาพการใช้โปรแกรมการฉีดวัคซีน 2

แบบ คือ แบบปกติฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และแบบประหยัดฉีดเข้าชั้นผิวหนัง แต่จะแบบจะได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 5 ครั้ง

เชรุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างดี ?

เชรุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเชรุม ส่วนของน้ำใสของเลือดที่ได้ออกมาหรือคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในเชรุมจะมีโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในปริมาณที่มาก เชรุมจะไปทำลายเชื้อไวรัสในร่างกายของผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัด โดยการฉีดรอบ ๆ แผลก่อนที่จะก่อโรค และก่อนที่ภูมิต้านทานของร่างกายจะสร้างขึ้น ด้วยเหตุนี้การให้เชรุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับการฉีดวัคซีนเข็มแรก จึงเป็นวิธีที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ผลดีที่สุด ทุกวัน เวลาราชการ

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า

1. เมื่อถูกสัตว์กัด การฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1-2 เข็ม ร่างกายก็จะได้ภูมิต้านทานที่สูงพอจะป้องกันโรคได้อย่างดีผล

2. ไม่เสี่ยงต่อการแพ้เชรุม หรือเจ็บปวดจากการฉีดเชรุมรอบ ๆ แผล

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการอย่างไร

? พบได้ 2 แบบคือ


1. แบบดุร้าย มีอาการหงุดหงิด ไล่กัดคน และสัตว์อื่น ๆ ถ้าถูกใช้หรือกัดขังไว้ในกรง จะกัดโซ่ กรง หรือสิ่งของที่อยู่กับอย่างดุร้าย เมื่อแสดงอาการดูรายได้ 2-3 วัน ก็จะอ่อนเพลียลง ขาหลังไม่มีแรง เดินโซเซ และตายในที่สุด

2. แบบเซื่องซึม มีอาการปากอ้าไม่ปิด ลิ้นมีสีแดงคล้ำ บางครั้งมีสิ่งสกปรกติดอยู่และลิ้นห้อยออกมานอกปาก มีอาการคล้ายกระดูกติดคอ สุนัขจะเอาขาน้ำตะกุกบริเวณแก้มปากและคอ ความ สุนัขจะลุกนั่ง ยืน และเดินไปมาบ่อย ๆ



SU-NAK.com

โรคพิษสุนัขบ้า



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-6648584

โทรสาร : 075-664578

<http://www.khaohong.go.th>